

Produktübersicht

froximun Medizinprodukte binden schädliches Ammonium sowie die Schwermetalle Blei und Quecksilber und leiten diese aus dem Körper aus, bevor Vitalfunktionen beeinträchtigt werden. Die Wirkung beruht dabei auf dem rein physikalischen Bindungsvorgang der Absorp-

tion. Durch froximun gebundene Gifte werden anschließend über den Darmausgang ausgeschieden.

froximun cama^{plus} ist das Basisprodukt der froximun Medizinprodukte-Serie. Es kombiniert den Wirkstoff MANC (modified and acti-

vated natural clinoptilolite) mit hochwertigem Korallen-Calcium und Magnesiumcarbonat. In Pulverform eingenommen, entfaltet froximun cama^{plus} seine Wirkung bereits im oberen Verdauungstrakt.



Produktdetails

Kurzbeschreibung:

Medizinprodukt zur Reduzierung der Ammoniumbelastung, MANC angereichert mit Korallen-Calcium und Magnesium

Verpackungstext:

froximun dient der Gesunderhaltung und Prävention (Vorbeugung) von Krankheiten. Die Wirkung beruht dabei auf der besonderen Eigenschaft, für Vitalfunktionen schädliches Ammonium bereits im Verdauungstrakt zu binden. Die Leber als wichtigstes Entgiftungsorgan des Menschen kann dadurch wesentlich entlastet werden.

Neben Ammonium bindet froximun auch die Schwermetalle Blei und Quecksilber - nachweislich und ganz natürlich! Ständige Kontrollen garantieren dabei die hohe Qualität und Wirksamkeit als Medizinprodukt gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG.

Inhalt und Zusammensetzung:

Verkaufsverpackung mit 30 Sticks à 3000 mg = 90 g Nettofüllmenge bestehend aus Klinoptilolith, Korallen-Calcium und Magnesiumcarbonat

Dosierung/Dauer der Anwendung:

- Vermischen Sie 1-2 mal pro Tag den Inhalt eines Sticks in ausreichend Flüssigkeit (bspw. einem Glas mit 0,3 l Wasser) und trinken Sie diese Mischung am besten vor einer Hauptmahlzeit
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Tageseinnahme von 2 Sticks, ohne Ihren Arzt oder Therapeuten konsultiert zu haben.
- Nach einer ununterbrochenen Einnahme von 30 Tagen eine Einnahmepause von 5 Tagen einhalten.

Warnhinweise:

- Während der Schwangerschaft, dem Stillen oder bei einem medizinischen Problem, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie froximun einnehmen.
- Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken.
- Nicht zeitgleich mit Medikamenten anwenden: Warten Sie mind. 60 Minuten nach der Einnahme von Medikamenten, bevor Sie froximun einnehmen.
- Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren.
- Den Stick nur unmittelbar vor der Einnahme öffnen.
- Trocken und bei unter 60°C lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Verwendbar bis siehe Bodenaufdruck

Verpackung und Kennzeichnung:

Verkaufsverpackung, 4farb Druck mit Anwendungs-, Dosierungs- und Warnhinweisen; PZN-Code (Deutschland): 5136804; EAN-13: 4-035303-121202; TÜV-0197 CE-Kennzeichnung; Der Grüne Punkt; Chargenkennzeichnung; Kennzeichnung "verwendbar bis"; Hersteller

Zulassung:

Zugelassenes Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der europäischen Richtlinie 92/43/EWG; benannte Stelle: TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Köln

Produktpreis und Lieferung:

Empfohlener Verkaufspreis: 64.00 sFr. (inkl. MwSt.); Einzelversand möglich

Hersteller:

froximun AG, Neue Straße 2, D-38838 Schlanstedt, Germany, Telefon: 039401/632-0, Telefax: 632-199

Vertrieb Schweiz:

genwell gmbh, Sihltalstrasse 103, 8135 Langnau am Albis, Schweiz
MwSt.-Nr. 699 234

