

Produktübersicht

froximun Medizinprodukte binden schädliches Ammonium sowie die Schwermetalle Blei und Quecksilber und leiten diese aus dem Körper aus, bevor Vitalfunktionen beeinträchtigt werden. Die Wirkung beruht dabei auf dem rein physikalischen Bindungsvorgang der Absorp-

tion. Durch froximun gebundene Gifte werden anschließend über den Darmausgang ausgeschieden.

froximun transfer kombiniert den Wirkstoff MAC (modified and activated clinoptilolite) mit hochwertigem Colostrum. Colostrum besitzt

durch seine besondere Zusammensetzung verschiedene biologisch aktive Substanzen, insbesondere Immunglobuline, Wachstumsfaktoren, Lymphokine, Transfer-Faktor, Lactoferrin, Transferin, Laktoperoxidase, Vitamine, Mineralien und Aminosäuren.



Produktdetails

Kurzbeschreibung:

Medizinprodukt zur Reduzierung der Ammoniumbelastung, angereichert mit Colostrum (laktosehaltig)

Verpackungstext:

froximun dient der Gesunderhaltung und Prävention (Vorbeugung) von Krankheiten. Die Wirkung beruht dabei auf der besonderen Eigenschaft, für Vitalfunktionen schädliches Ammonium bereits im Verdauungstrakt zu binden. Die Leber als wichtigstes Entgiftungsorgan des Menschen kann dadurch wesentlich entlastet werden.

Neben Ammonium bindet froximun auch die Schwermetalle Blei und Quecksilber - nachweislich und ganz natürlich! Ständige Kontrollen garantieren dabei die hohe Qualität und Wirksamkeit als Medizinprodukt gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG.

Inhalt und Zusammensetzung:

Verkaufsverpackung mit 10 Blistern à 10 Kapseln = 100 Kapseln à 455 mg bestehend aus Klinoptilolith und Colostrum, Kapselmateriale: Cellulose.

Dosierung/Dauer der Anwendung:

- Nehmen Sie 1-2 Kapseln vor jeder Hauptmahlzeit (dreimal täglich) mit ausreichend Flüssigkeit (bspw. einem Glas mit 0,2 l Wasser) ein.

- Überschreiten Sie nicht die angegebene Tageseinnahme von 6 Kapseln, ohne Ihren Arzt oder Therapeuten konsultiert zu haben.
- Nach einer ununterbrochenen Einnahme von 30 Tagen eine Einnahmepause von 5 Tagen einhalten.

Warnhinweise:

- Enthält Laktose. Nicht bei Laktose-Intoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit) anwenden.
- Während der Schwangerschaft, dem Stillen oder bei einem medizinischen Problem, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie froximun einnehmen.
- Beenden Sie die Einnahme, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken.
- Nicht zeitgleich mit Medikamenten anwenden: Warten Sie mind. 60 Minuten nach der Einnahme von Medikamenten, bevor Sie froximun einnehmen.
- Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren.
- Die Kapseln nur unmittelbar vor der Einnahme aus der Blisterverpackung entnehmen.
- Trocken und bei unter 60°C lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Verwendbar bis siehe Bodenaufdruck

Verpackung und Kennzeichnung:

Verkaufsverpackung, 4farb Druck mit Anwendungs-, Dosierungs- und Warnhinweisen;

PZN-Code (Deutschland): 4229076; EAN-13: 4-035303-110114; TÜV-0197 CE-Kennzeichnung; Der Grüne Punkt; Chargenkennzeichnung; Kennzeichnung "verwendbar bis"; Hersteller

Zulassung:

Zugelassenes Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der europäischen Richtlinie 92/43/EWG; zulassende Stelle: TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Köln

Produktpreis und Lieferung:

Empfohlener Verkaufspreis: sFR. 80.00 (inkl. MwSt.); Einzelversand möglich

Hersteller:

froximun AG, Neue Straße 2, D-38838 Schlanstedt, Germany, Telefon: 039401/632-0, Telefax: 632-199

Vertrieb Schweiz:

genwell gmbh, Sihltalstrasse 103, 8135 Langnau am Albis, Schweiz MwSt.-Nr. 699 234

